

Основы теории открытых квантовых систем. Лекция 8.

Теретёнков Александр Евгеньевич

25 октября 2021 г.

Обобщённые уравнения Блоха

Обобщённые вектора Блоха

$$\rho = \frac{1}{n}I + \sum_{k=1}^{n^2-1} v_k F_k$$

Уравнение ГКСЛ в форме Коссаковского (в самосопряжённом базисе)

$$\frac{d}{dt}\rho_t = -i[H, \rho_t] + \sum_{i=1, k=1}^{n^2-1} a_{ik} ([F_i, \rho_t F_k] + [F_i \rho_t, F_k]),$$

где матрица $a = a^\dagger \geq 0$.

$$H = \sum_{k=1}^{n^2-1} h_k F_k$$

Обобщённые уравнения Блоха

Обобщённые уравнения Блоха

$$\dot{v} = Gv + b$$

(вещественные v)

$$G = Q + R$$

Обобщённые уравнения Блоха

$$\begin{aligned}Q_{sm} &= \sum_{j=1}^{n^2-1} h_j f_{jms} \\R_{sm} &= -\frac{1}{4} \sum_{j,k,l=1}^{n^2-1} a_{jk} (z_{jlm} f_{kls} + \bar{z}_{klm} f_{jls}) = \\&= -\frac{1}{4} \sum_{j \leq k, l=1}^{n^2-1} (2 - \delta_{jk}) \operatorname{Re} a_{jk} (f_{jlm} f_{kls} + f_{klm} f_{jls}) + \\&\quad + \frac{1}{2} \sum_{j \leq k, l=1}^{n^2-1} \operatorname{Im} a_{jk} (-d_{jlm} f_{kls} + d_{klm} f_{jls}) \\b_s &= \frac{i}{n} \sum_{j=1}^{n^2-1} a_{jk} f_{jks} = -\frac{2}{n} \sum_{j < k=1}^{n^2-1} \operatorname{Im} a_{jk} f_{jks}\end{aligned}$$

Обобщённые уравнения Блоха

$$Q = -Q^T$$

В случае $n = 2$ в общем случае $R = R^T$ (и так было в наших примерах). В случае произвольного n это неверно, однако если a — вещественная матрица, то $R = R^T$.

Свойства спектра

- Из того, что уравнения Блоха (в самосопряжённом базисе) вещественные следует, что если собственное значение комплексное, то и сопряжённое является собственным значением.

Свойства спектра

- Из того, что уравнения Блоха (в самосопряжённом базисе) вещественные следует, что если собственное значение комплексное, то и сопряжённое является собственным значением.
- Вещественные части собственных чисел генератора ГКСЛ не положительны.

Свойства спектра

- Из того, что уравнения Блоха (в самосопряжённом базисе) вещественные следует, что если собственное значение комплексное, то и сопряжённое является собственным значением.
- Вещественные части собственных чисел генератора ГКСЛ не положительны.
- Даже если нулевое собственное значение вырождено для него не возникает жордановых блоков.

Свойства спектра

- Из того, что уравнения Блоха (в самосопряжённом базисе) вещественные следует, что если собственное значение комплексное, то и сопряжённое является собственным значением.
- Вещественные части собственных чисел генератора ГКСЛ не положительны.
- Даже если нулевое собственное значение вырождено для него не возникает жордановых блоков.
- Но случай жордановых блоков можно получить уже для двухуровневой системы, положив

$$a = \frac{1}{16} \begin{pmatrix} 16 & 4i & 3 \\ -4i & 16 & 1 + 4i \\ 3 & 1 - 4i & 18 \end{pmatrix}$$

Вполне положительные отображения

Линейное отображение $\Phi : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$ называется **положительным**, если

$$\Phi(X) \geq 0 \quad \forall X \geq 0$$

Вполне положительные отображения

Линейное отображение $\Phi : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$ называется **положительным**, если

$$\Phi(X) \geq 0 \quad \forall X \geq 0$$

Линейное отображение $\Phi : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$ называется **вполне положительным**, если отображение

$$\Phi \otimes \mathcal{I}_{n^2} : \mathbb{C}^{n^2 \times n^2} \rightarrow \mathbb{C}^{n^2 \times n^2}$$

положительно. $(\Phi \otimes \mathcal{I}_{n^2})(X \otimes Y) = \Phi(X) \otimes Y$.

Вполне положительные отображения

Вполне положительность в более явном виде:

$$\Phi \otimes \mathcal{I}_{n^2} \underbrace{\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}}_{\forall \geq 0} = \begin{pmatrix} \Phi(A_{11}) & \cdots & \Phi(A_{1n}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Phi(A_{n1}) & \cdots & \Phi(A_{nn}) \end{pmatrix} \geq 0$$

Вполне положительные отображения

Иногда также вводят k -положительные отображения:

Отображение называется k -положительным, если отображение

$$\Phi \otimes \mathcal{I}_{k^2} : \mathbb{C}^{nk \times nk} \rightarrow \mathbb{C}^{nk \times nk}$$

положительно.

Вполне положительные отображения

Отображение сохраняет след, если

$$\mathrm{Tr} \Phi(X) = \mathrm{Tr} X, \quad \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

Сохраняющее след вполне положительное отображение называется **квантовым каналом** (в представлении Шредингера). Отметим, что если Φ сохраняет след, то и $\Phi \otimes \mathcal{I}_{k^2}$ сохраняет след.

Вполне положительные отображения

Положительные отображения являются аналогом матриц с неотрицательными коэффициентами. Очевидно, что если A — матрица с неотрицательными коэффициентами, то $A \otimes \mathcal{I}_{k^2}$ тоже такова, поэтому в классическом случае условие вполне положительности является излишним.

Вполне положительные отображения

Положительные отображения являются аналогом матриц с неотрицательными коэффициентами. Очевидно, что если A — матрица с неотрицательными коэффициентами, то $A \otimes \mathcal{I}_{k^2}$ тоже такова, поэтому в классическом случае условие вполне положительности является излишним.

Условие нормировки выделяющее стохастической матрицы $e^T P p = e^T p$ аналогично условию сохранению следа. Поэтому квантовые каналы являются аналогами стохастических матриц (классических каналов).

Вполне положительные отображения

Отображение называется унитарным (сохраняющим единицу), если

$$\Phi(I) = I$$

Вполне положительные отображения

Отображение называется унитарным (сохраняющим единицу), если

$$\Phi(I) = I$$

Утверждение. $\text{Tr } \Phi(X) = \text{Tr } X, \quad \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n} \Leftrightarrow \Phi^*(I) = I.$

Вполне положительные отображения

Отображение называется унитарным (сохраняющим единицу), если

$$\Phi(I) = I$$

Утверждение. $\text{Tr } \Phi(X) = \text{Tr } X, \quad \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n} \Leftrightarrow \Phi^*(I) = I.$

Доказательство:

$$\text{Tr } X = \text{Tr } \Phi(X) = \text{Tr } I^\dagger \Phi(X) = \text{Tr}(\Phi^*(I))^\dagger X$$

Выбирая в качестве $X = |i\rangle\langle j|$, получим $\Phi^*(I) = I.$



Вполне положительные отображения

Отображение называется унитарным (сохраняющим единицу), если

$$\Phi(I) = I$$

Утверждение. $\text{Tr } \Phi(X) = \text{Tr } X, \quad \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n} \Leftrightarrow \Phi^*(I) = I.$

Доказательство:

$$\text{Tr } X = \text{Tr } \Phi(X) = \text{Tr } I^\dagger \Phi(X) = \text{Tr}(\Phi^*(I))^\dagger X$$

Выбирая в качестве $X = |i\rangle\langle j|$, получим $\Phi^*(I) = I.$ □

Поэтому можно говорить, что унитарное вполне положительное отображение задаёт квантовый канал в представлении Гейзенберга.

Вполне положительные отображения

Отображение называется унитарным (сохраняющим единицу), если

$$\Phi(I) = I$$

Утверждение. $\text{Tr } \Phi(X) = \text{Tr } X, \quad \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n} \Leftrightarrow \Phi^*(I) = I.$

Доказательство:

$$\text{Tr } X = \text{Tr } \Phi(X) = \text{Tr } I^\dagger \Phi(X) = \text{Tr}(\Phi^*(I))^\dagger X$$

Выбирая в качестве $X = |i\rangle\langle j|$, получим $\Phi^*(I) = I.$ □

Поэтому можно говорить, что унитарное вполне положительное отображение задаёт квантовый канал в представлении Гейзенберга.

В классике, аналогом этого утверждения была возможность переписать условие нормировки как $P^T e = e.$

Вполне положительные отображения

Вполне положительное отображение, которое одновременно сохраняет след и унитарно, часто называют **бистохастическим** каналом (иногда унитарным), так как оно аналогично бистохастическим матрицам $Pe = e, P^T e = e$.

Соответствие Чоя-Ямилковского

Максимально сцепленное состояние в $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^n$

$$|\Omega\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^n |j\rangle \otimes |j\rangle$$

$$|\Omega\rangle\langle\Omega| = \frac{1}{n} \sum_{i,j=1}^n |i\rangle\langle j| \otimes |i\rangle\langle j|$$

Соответствие Чоя-Ямилковского

Соответствие (иногда говорят изоморфизм) Чоя-Ямилковского:
Каждому линейному отображению $\Phi : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$
сопоставим $n^2 \times n^2$ -матрицу

$$\rho_\Phi = \Phi \otimes \mathcal{I}_{n^2} (|\Omega\rangle\langle\Omega|).$$

Упражнение. Соответствие Чоя-Ямилковского является обратимым. Обратное соответствие задаётся формулой

$$\Phi(X) = n \operatorname{Tr}_R \rho_\Phi(I_n \otimes X^T)$$

X^T — транспонирование в базисе $|j\rangle$

Соответствие Чоя-Ямилковского

Если Φ — квантовый канал, то ρ_Φ является матрицей плотности.

Доказательство: В силу вполне положительности

$$\Phi \otimes \mathcal{I}_{n^2}(|\Omega\rangle\langle\Omega|) \geq 0.$$

В силу сохранения нормировки ρ_Φ — положителен. □

Утверждение. Φ — канал тогда и только тогда, когда

$$\Phi(\rho) = \sum_{l=1}^{n'} W_l \rho W_l^\dagger, \quad \sum_{l=1}^{n'} W_l^\dagger W_l = I_n.$$

(минимальное число членов будем называть крауссовским рангом $W = \text{rank}\Phi$).

Представление Крауса

Доказательство: Произвольную матрицу плотности можно представить в виде

$$\rho_{\Phi} = \sum_{l=1}^{n'} |w_l\rangle\langle w_l|, \quad n' \leq n^2, \quad |w_l\rangle \in \mathbb{C}^{n^2},$$

где $\min n' = \text{rank } \rho_{\Phi}$. В частности всегда можно выбрать $\langle w_l | w_k \rangle = ||w_l||^2 \delta_{lk}$.

Введём матрицы $W_l \in \mathbb{C}^{n \times n}$ по формуле

$$\langle k | W_l | i \rangle = \sqrt{n} \langle k \otimes i | w_l \rangle$$

Представление Крауса

Так как $\langle k \otimes i | \rho_{\Phi} | m \otimes j \rangle = \frac{1}{n} \langle k | \Phi(|i\rangle\langle j|) | m \rangle$, то

$$\sum_{l=1}^{n'} \langle k \otimes i | w_l \rangle \langle w_l | m \otimes j \rangle = \frac{1}{n} \langle k | \Phi(|i\rangle\langle j|) | m \rangle$$

$$\frac{1}{n} \sum_{l=1}^{n'} \langle k | W_l | i \rangle \langle j | W_l^{\dagger} | m \rangle = \frac{1}{n} \langle k | \Phi(|i\rangle\langle j|) | m \rangle$$

$$\sum_{l=1}^{n'} \sum_{i,j} \langle k | W_l | i \rangle \langle i | \rho | j \rangle \langle j | W_l^{\dagger} | m \rangle = \langle k | \Phi(\rho) | m \rangle$$

$$\sum_{l=1}^{n'} W_l \rho W_l^{\dagger} = \Phi(\rho)$$

Сохранение следа

$$\sum_{l=1}^{n'} W_l^\dagger W_l = I_n$$

Представление Крауса

Наоборот, если

$$\Phi(\rho) = \sum_{l=1}^{n'} W_l \rho W_l^\dagger,$$

то для $X \geq 0$

$$\begin{aligned} \Phi \otimes I_n(X) &= \sum_{l=1}^{n'} W_l \otimes I_n X (W_l \otimes I_n)^\dagger = \\ &= \sum_{l=1}^{n'} \sum_x W_l \otimes I_n |x\rangle \langle x| (W_l \otimes I_n)^\dagger \geq 0 \quad \square \end{aligned}$$

Представление Крауса

$$\begin{pmatrix} W_1 \\ \vdots \\ W_{n'} \end{pmatrix}$$

— матрица из n ортонормированных векторов (репер) в $k = n \times n'$ -мерном пространстве. Множество таких ортонормированных наборов называется (комплексным) многообразием Штифеля при фиксированных n и k .

$$\begin{pmatrix} W_1^\dagger & \cdots & W_{n'}^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_1 \\ \vdots \\ W_{n'} \end{pmatrix} = I_n$$

Унитарность

$$\sum_{l=1}^{n'} W_l W_l^\dagger = I_n$$

Представление Крауса

Разложение Крауса в ортонормированном базисе

$$W_l = \sum_{i=1}^{n^2} F_i \operatorname{Tr}(F_i^+ W_l), \quad \operatorname{Tr} F_i^+ F_j = \delta_{ij}$$

$$\Phi(\rho) = \sum_{l=1}^{n'} W_l \rho W_l^\dagger = \sum_{i,j=1}^{n^2} \underbrace{\sum_{l=1}^{n'} \operatorname{Tr}(F_i^+ W_l) \overline{\operatorname{Tr}(F_j^+ W_l)}}_{C_{ij}} F_i \rho F_j^\dagger$$

$$C \geq 0$$

Сводная таблица для представления Чоя-Ямилковского

$$\Phi : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$$

$$\Phi(X^\dagger) = \Phi(X)^\dagger$$

$$\text{tr} \Phi(\rho) = \text{tr} \rho$$

$$\Phi(I) = I$$

$$(\Phi \otimes I_n)(X) \geq 0, \forall X \geq 0$$

$$(\Phi \otimes I_k)(X) \geq 0, \forall X \geq 0, k \leq n$$

$$\Phi(\rho) = \sum_l W_l \rho W_l^\dagger$$

$$W - \text{rank} \Phi$$

$$\text{tr} F_l^\dagger F_k = \delta_{lk}$$

$$\Phi(\rho) = \sum_{lk} C_{lk} F_l \rho F_k^\dagger$$

$$\rho_\Phi : \mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\rho_\Phi^\dagger = \rho_\Phi$$

$$\text{Tr}_R \rho_\Phi = \frac{I_n}{n}$$

$$\text{Tr}_S \rho_\Phi = \frac{I_n}{n}$$

$$\rho_\Phi \geq 0$$

$$\langle \psi | \rho_\Phi | \psi \rangle \geq 0, S - \text{rank}(|\psi\rangle) = k$$

$$\rho_\Phi = \sum_l |w_l\rangle \langle w_l|$$

$$\text{rank} \rho_\Phi$$

$$\langle \varphi_l | \varphi_k \rangle = \delta_{lk}$$

$$\rho_\Phi = \sum_{lk} C_{lk} |\varphi_l\rangle \langle \varphi_k|$$

$S - \text{rank}(|\psi\rangle) \equiv \text{rank} \text{Tr}_R |\psi\rangle \langle \psi|$ — ранг Шмидта.