



Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

А. Н. Абызов, О некоторых классах полуартиновых колец, *Сиб. матем. журн.*, 2012, том 53, номер 5, 955–966

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением  
<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 3.144.232.239

27 сентября 2024 г., 03:46:13



## О НЕКОТОРЫХ КЛАССАХ ПОЛУАРТИНОВЫХ КОЛЕЦ

А. Н. АБЫЗОВ

**Аннотация.** Известно, что для произвольного кольца  $R$  из слабой регулярности всех правых  $R$ -модулей не следует слабая регулярность всех левых  $R$ -модулей. В настоящей статье описаны кольца, над которыми каждый правый и левый модули слабо регулярны. Также получено описание полуартиновых  $CSL$ -колец.

**Ключевые слова:** слабо регулярный модуль, квазипроективный модуль, полуартиново кольцо,  $SV$ -кольцо,  $CSL$ -кольцо.

Работа является непосредственным продолжением [1, 2]. Определения и результаты из [2–4] предполагаются известными. Слова типа «полуартиново кольцо» означают, что соответствующие условия выполнены справа и слева.

В монографии [5, с. 452] поставлена проблема о существовании обобщенного справа  $SV$ -кольца, которое не является обобщенным слева  $SV$ -кольцом. Соответствующий пример кольца приведен в [1, с. 735]. В разд. 2 настоящей статьи для произвольного кольца  $R$  приводим ряд необходимых и достаточных условий, при которых  $R$  является обобщенным  $SV$ -кольцом. В разд. 3 изучаются связи между  $SV$ -кольцами,  $CSL$ -кольцами,  $CC$ -кольцами и мод-ретрактабельными кольцами.

### 1. Предварительные результаты

Настоящий раздел содержит необходимые для дальнейших рассуждений результаты, многие из которых касаются квазипроективных модулей. Рассмотрение квазипроективных модулей позволяет развивать соответствующую теорию в рамках категорий Висбауэра и получать результаты, связанные с гомологической классификацией модулей. Данный подход предложен Висбауэром и широко предоставлен в его монографии [6].

Согласно [7, с. 76] в полуартиновом справа кольце каждый примитивный справа идеал является примитивным слева идеалом, и наоборот. Поэтому в дальнейшем при рассмотрении полуартиновых колец мы не будем различать примитивные справа и слева идеалы.

**Лемма 1.1.** *Для полуартинова справа кольца  $R$  следующие условия равносильны:*

- (1) *у кольца  $R$  каждый примитивный образ артинов;*
- (2) *для каждого фактор-кольца  $R/S$ , у которого  $J(R/S) = 0$ , каждая однородная компонента  $\text{Soc}(R/S_R)$  имеет конечную длину;*

---

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта № 10-01-00431-а).

(3) для каждого простого правого  $R$ -модуля  $S$  левое векторное пространство  ${}_{\text{End}(S)}S$  конечномерно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (1) $\Rightarrow$ (2) Предположим противное. Тогда для некоторого фактор-кольца  $R/S$  такого, что  $J(R/S) = 0$ , одна из однородных компонент  $\text{Soc}(R/S_R)$  имеет бесконечную длину. Легко видеть, что в этом случае в кольце  $R/S$  найдется бесконечное семейство взаимно ортогональных ненулевых идемпотентов  $e_1, e_2, \dots$  такое, что  $e_1R$  — простой подмодуль модуля  $R/S_R$  и  $e_1R \cong e_iR$  для каждого натурального  $i$ . Тогда  $T = \text{Ann}(e_1R)$  — примитивный идеал и  $e_i \notin T/S$  для каждого  $i$ . Следовательно,  $R/T$  содержит бесконечное семейство взаимно ортогональных ненулевых идемпотентов, что противоречит предположению п. 1.

(2) $\Rightarrow$ (1) Пусть  $T$  — примитивный идеал кольца  $R$ . Тогда очевидно, что  $\text{Soc}(R/T_R)$  имеет только одну однородную компоненту. Следовательно, длина модуля  $\text{Soc}(R/T_R)$  конечна, и  $R/T$  — артиново кольцо.

(1) $\Rightarrow$ (3) Пусть  $S$  — простой правый  $R$ -модуль и  $P$  — его аннулятор. Тогда  $S$  можно рассматривать как правый  $R/P$ -модуль. Так как  $R/P$  — простое артиново кольцо, то  $\dim({}_{\text{End}(S)}S) = \text{lg}(R/P_{R/P})$ .

(3) $\Rightarrow$ (1) Пусть  $P$  — примитивный идеал кольца  $R$ . Если  $R/P$  не является артиновым, то  $\text{Soc}(R/P)$  не является модулем конечной длины. Тогда в кольце  $R/P$  найдется бесконечное семейство примитивных взаимно ортогональных идемпотентов  $e_1, e_2, \dots$  такое, что  $e_1R \cong e_iR$  для каждого натурального  $i$ . Так как  $e_1Re_i \neq 0$ , то  $\bigoplus_{i=1}^{\infty} e_1Re_i$  является бесконечномерным подпространством левого векторного пространства  ${}_{e_1Re_1}e_1R$ , что противоречит условию п. 3.  $\square$

Для произвольного правого  $R$ -модуля  $M$  введем следующее условие:

(\*) для каждого инвариантного подмодуля  $N$  модуля  $M$ , у которого  $J(M/N) = 0$ , однородные компоненты  $\text{Soc}(M/N)$  имеют конечные длины.

**Лемма 1.2.** Пусть  $P$  — конечно порожденный квазипроективный  $R$ -модуль. Если у кольца  $\text{End}(P)$  каждый примитивный образ артинов, то модуль  $P$  удовлетворяет условию (\*).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим противное. Тогда существует такой инвариантный подмодуль  $P_0$  модуля  $P$ , что  $J(P/P_0) = 0$  и  $P/P_0$  содержит подмодуль вида  $\bigoplus_{i=1}^{\infty} N_i$ , где  $(N_i)_{i=1}^{\infty}$  — попарно изоморфные простые подмодули модуля  $P/P_0$ . Так как  $P$  квазипроективен, естественный гомоморфизм  $\varphi : \text{End}(P)/\text{Hom}(P, P_0) \rightarrow \text{End}(P/P_0)$  является изоморфизмом. Из [6, 22.2] следует, что  $J(\text{End}(P/P_0)) = 0$ . Поскольку каждый простой подмодуль в  $P/P_0$  является прямым слагаемым,  $\text{Hom}(P/P_0, N_i) \neq 0$  для каждого  $i$ . Согласно [2, лемма 1] правый  $\text{End}(P/P_0)$ -модуль  $\text{Hom}(P/P_0, \bigoplus_{i=1}^{\infty} N_i) = \bigoplus_{i=1}^{\infty} \text{Hom}(P/P_0, N_i)$  полупрост. Следовательно, у кольца  $\text{End}(P)/\text{Hom}(P, P_0)$  цоколь содержит однородную компоненту бесконечной длины. Из доказательства импликации (1) $\Rightarrow$ (2) леммы 1.1 следует, что у кольца  $\text{End}(P)$  не каждый примитивный образ артинов. Получили противоречие с предположением исходной леммы.  $\square$

Следующая лемма непосредственно вытекает из [8, следствие 2.2].

**Лемма 1.3.** Для примитивного справа кольца  $R$  следующие условия равносильны:

(1)  $R$  — классически полупростое кольцо;

(2) в кольце  $R$  существует такой идемпотент  $e$ , что  $eR$  и  $Re$  являются соответственно правым и левым простыми инъективными  $R$ -модулями.

Для произвольного правого  $R$ -модуля  $M$  с помощью трансфинитной индукции для каждого ординального числа  $\alpha$  определим подмодуль  $SI(M)$  следующим образом. При  $\alpha = 0$  положим  $SI_\alpha(M) = 0$ . Если  $\alpha = \beta + 1$ , то  $SI_{\beta+1}(M)/SI_\beta(M)$  — сумма всех простых  $M/SI_\beta(M)$ -инъективных подмодулей правого  $R$ -модуля  $M/SI_\beta(M)$ . Когда  $\alpha$  — предельное ординальное число, положим  $SI_\alpha(M) = \bigcup_{\beta < \alpha} SI_\beta(M)$ . Пусть  $\tau$  — наименьший ординал, для которого имеют место равенства  $SI_\tau(M) = SI_{\tau+1}(M)$ . Далее через  $SI(M)$  будем обозначать подмодуль  $SI_\tau(M)$ , для произвольного кольца  $R$  и каждого ординала  $\alpha$  через  $SI_\alpha(R)$  — правый идеал  $SI_\alpha(R_R)$ , который, как легко заметить, является идеалом.

**Лемма 1.4.** Пусть  $P$  — произвольный правый  $R$ -модуль,  $N$  — простой  $P/SI_\alpha(P)$ -инъективный модуль. Тогда  $N$   $P$ -инъективен.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Предположим противное. Пусть  $\alpha$  — наименьший ординал, для которого утверждение леммы не выполняется. Согласно [6, 16.3] существует эпиморфизм  $f : \bigoplus_{i \in I} P_i \rightarrow E_P(N)$ , где  $\bigoplus_{i \in I} P_i$  — внешняя прямая сумма модулей и  $P_i = P$  для каждого  $i$ . Допустим, что  $f(SI_\alpha(\bigoplus_{i \in I} P_i)) \neq 0$ . Пусть  $\beta \leq \alpha$  — наименьший ординал, для которого имеет место неравенство  $f(SI_\beta(\bigoplus_{i \in I} P_i)) \neq 0$ . Ясно, что  $\beta$  — непрелый ординал. Тогда гомоморфизм  $f$  индуцирует ненулевой гомоморфизм

$$\bar{f} : SI_\beta(\bigoplus_{i \in I} P_i)/SI_{\beta-1}(\bigoplus_{i \in I} P_i) \rightarrow E_P(N).$$

Следовательно,  $E_P(N)$  содержит в себе простой  $P$ -инъективный подмодуль, и  $E_P(N) = N$ . Предположим теперь, что  $f(SI_\alpha(\bigoplus_{i \in I} P_i)) = 0$ . Тогда гомоморфизм  $f$  индуцирует эпиморфизм  $\bar{f} : \bigoplus_{i \in I} P_i/SI_\alpha(\bigoplus_{i \in I} P_i) \rightarrow E_P(N)$ . Легко видеть, что

$$\bigoplus_{i \in I} P_i/SI_\alpha(\bigoplus_{i \in I} P_i) \cong \bigoplus_{i \in I} (P_i/SI_\alpha(P_i)).$$

Тем самым  $E_P(N) \in \sigma(P/SI_\alpha(P))$ , и поскольку  $N$  —  $P/SI_\alpha(P)$ -инъективный модуль, имеем  $E_P(N) = N$ .  $\square$

**Лемма 1.5.** Пусть  $P$  — квазипроективный модуль,  $N_0$  — локальный  $P$ -инъективный подмодуль модуля  $P$  длины не больше двух, у которого  $N_0/J(N_0)$   $P$ -инъективен, и  $P = N_1 \oplus \dots \oplus N_k \oplus N$ , где  $N_i \cong N_0$  для каждого  $i$ , а  $N$  — подмодуль модуля  $P$ , который не содержит подмодулей, изоморфных модулю  $N_0$ . Если модули  $N_0$  и  $P/I(P)$  не имеют изоморфных простых подфакторов, то  $N_1 \oplus \dots \oplus N_k = \pi(P)$ , где  $\pi$  — центральный идемпотент кольца  $\text{End}(P)$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $\pi$  — проекция модуля  $P$  на подмодуль  $N_1 \oplus \dots \oplus N_k$  относительно разложения  $P = N_1 \oplus \dots \oplus N_k \oplus N$ . Покажем, что  $\pi$  — центральный идемпотент кольца  $S = \text{End}(P)$ . Если  $(1 - \pi)S\pi \neq 0$ , то существует ненулевой гомоморфизм из подмодуля  $\pi P$  в подмодуль  $(1 - \pi)P = N$ . Легко видеть, что в этом случае в подмодуле  $N$  найдется подмодуль, изоморфный модулю  $N_0$ , что противоречит выбору подмодуля  $N$ . Таким образом,  $(1 - \pi)S\pi = 0$ .

Покажем теперь, что  $\pi S(1-\pi) = 0$ . Предположим противное. Тогда существует ненулевой гомоморфизм из подмодуля  $N$  в подмодуль  $\pi P$ . Этот гомоморфизм можем продолжить до такого гомоморфизма  $\phi$ , действующего из  $P$  в  $\pi P$ , что  $\phi(\pi P) = 0$ . В силу выбора модуля  $N$  имеем  $\phi(I_1(P)) = 0$ . Тогда гомоморфизм  $\phi$  индуцирует ненулевой гомоморфизм  $\tilde{\phi} : P/I_1(P) \rightarrow \pi P \subset I_1(P)$ . С помощью трансфинитной индукции несложно показать, что для каждого ординала  $\alpha$  имеет место равенство  $\tilde{\phi}(I_\alpha(P)/I_1(P)) = 0$ . Тогда гомоморфизм  $\tilde{\phi}$  индуцирует ненулевой гомоморфизм  $\tilde{\phi} : P/I(P) \rightarrow \pi P$ . Следовательно, у модулей  $P/I(P)$  и  $\pi P$  имеются изоморфные простые подфакторы, что противоречит выбору модуля  $\pi P$ . Таким образом,  $(1-\pi)S\pi = \pi S(1-\pi) = 0$ , и, значит,  $\pi$  — центральный идемпотент кольца  $\text{End}(P)$ .  $\square$

Пример кольца верхнетреугольных матриц второго порядка над некоторым полем показывает, что предыдущая лемма перестает быть верной, если в ней опустить условие о неизоморфности простых подфакторов модулей  $N_0$  и  $P/I(P)$ .

Следующие два утверждения непосредственно вытекают из леммы 1.5.

**Следствие 1.6.** Пусть  $P$  — квазипроективный самопорождающийся обобщенный  $SV$ -модуль,  $N_0$  — простой  $P$ -инъективный модуль и  $P = N_1 \oplus \dots \oplus N_k \oplus N$ , где  $N_i \cong N_0$  для каждого  $i$ , а  $N$  — подмодуль модуля  $P$ , который не содержит подмодулей, изоморфных модулю  $N_0$ . Тогда  $N_1 \oplus \dots \oplus N_k = \pi(P)$ , где  $\pi$  — центральный идемпотент кольца  $\text{End}(P)$ .

**Следствие 1.7.** Пусть  $P$  — квазипроективный обобщенный  $SV$ -модуль. Если  $P$  — самопорождающийся модуль, удовлетворяющий условию (\*), то для каждого ординала  $\alpha$  существует такое семейство взаимно ортогональных центральных идемпотентов  $\{\pi_i\}_{i \in I}$  из  $\text{End}(P/SI_\alpha(P))$ , что

$$SI_{\alpha+1}(P)/SI_\alpha(P) = \bigoplus_{i \in I} \pi_i(P/SI_\alpha(P)).$$

**Лемма 1.8.** Пусть  $P$  — конечно порожденный квазипроективный самопорождающийся обобщенный правый  $SV$ -модуль и  $SI_1(P) = 0$ . Если  $P$  — неполулокальный модуль, то полупростой модуль  $I_1(P)/J(I_1(P))$  имеет блок бесконечной длины.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Предположим, что  $P$  — неполулокальный модуль и все блоки полупростого модуля  $I_1(P)/J(I_1(P))$  имеют конечные длины. Согласно [2, теорема 13]  $P/I(P)$  представим в виде прямой суммы локальных модулей длины не больше двух. Тогда  $P/I(P)$  имеет конечную длину и, следовательно, модуль  $P/I(P)$  с точностью до изоморфизма имеет конечное число простых подфакторов. Пусть  $S_1, \dots, S_n$  — представители классов изоморфизмов простых подфакторов модуля  $P/I(P)$ . Так как модуль  $P$  не является полулокальным, модуль  $I_1(P)$  имеет бесконечную длину. Поскольку  $SI(P) = 0$ , несложно заметить, что  $I_1(P)$  является прямой суммой локальных модулей длины два. В силу предположения в модуле  $I_1(P)$  существуют  $n+1$  попарно не изоморфных локальных подмодулей длины два. Тогда модуль  $I_1(P)$  обладает локальным подмодулем  $N$  длины два, у которого все подфакторы не изоморфны ни одному из модулей  $S_1, \dots, S_n$ . Из предположения непосредственно следует, что модуль  $P$  можно представить в виде  $P = N_1 \oplus \dots \oplus N_k \oplus M$ , где  $N_i \cong N$  для каждого  $i$ , а модуль  $M$  не содержит подмодулей, изоморфных модулю  $N$ . Согласно лемме 1.5 существует такой центральный идемпотент

$\pi \in \text{End}(P)$ , что  $N_1 \oplus \dots \oplus N_k = \pi(P)$ . Поскольку  $P$  — порождающий объект категории  $\sigma(P)$ , существует ненулевой гомоморфизм из  $P$  в  $J(N)$ . Таким образом, существует такой гомоморфизм  $f \in \text{End}(P)$ , что  $Jm(f) = J(N_1)$ . Так как  $f((1 - \pi)(P)) = \pi f((1 - \pi)(P)) = f\pi((1 - \pi)(P)) = 0$ , то  $f((1 - \pi)(P)) = 0$  и модуль  $J(N)$  является гомоморфным образом модуля  $N_1 \oplus \dots \oplus N_k$ . Тогда  $J(N) \cong N/J(N)$ , что противоречит  $P$ -инъективности модуля  $N/J(N)$ . Полученное противоречие показывает, что у полупростого модуля  $I_1(P)/J(I_1(P))$  имеется блок бесконечной длины.  $\square$

Модуль  $M$  назовем *CSL-модулем*, если каждый модуль  $N$  из категории  $\sigma(M)$ , у которого  $\text{End}(N)$  — тело, является простым. Кольцо  $R$  называется *правым CSL-кольцом*, если модуль  $R_R$  является CSL-модулем. Следуя [9], назовем кольцо  $R$  *правым CC-кольцом*, если  $\text{Hom}(M/N, M) \neq 0$  для каждого ненулевого правого  $R$ -модуля  $M$  и его собственного подмодуля  $N$ . Модуль  $P$  назовем *правым mod-ретрактабельным*, если  $\text{Hom}(M, N) \neq 0$  для каждого ненулевого правого  $R$ -модуля  $M \in \sigma(P)$  и его ненулевого подмодуля  $N$ . Кольцо  $R$  называется *правым mod-ретрактабельным*, если модуль  $R_R$  является правым mod-ретрактабельным. Правые mod-ретрактабельные кольца введены в [10]. Далее для произвольных правых  $R$ -модулей  $M$  и  $N$  через  $\text{tr}_N(M)$  будем обозначать подмодуль модуля  $N$  вида 
$$\sum_{f \in \text{Hom}_R(M, N)} f(M).$$

**Лемма 1.9.** *Имеют место следующие утверждения.*

- (1) *Если  $P$  — квазипроективный полуартинов CSL-модуль, то каждый проективный простой модуль из категории  $\sigma(P)$  является  $P$ -инъективным.*
- (2) *Пусть  $R$  — полуартиново справа правое CSL-кольцо,  $e$  — идемпотент кольца  $R$ , у которого правый идеал  $eR$  является прямой суммой локальных правых  $R$ -модулей и правые идеалы  $eR, (1 - e)R$  не содержат изоморфных ненулевых прямых слагаемых. Если  $R$  является правым тах-кольцом, то  $e$  — центральный идемпотент.*
- (3) *Если  $R$  — полуартиново CSL-кольцо, то каждый примитивный образ кольца  $R$  артинов.*
- (4) *Каждое правое CC-кольцо является правым CSL-кольцом.*
- (5) *Если  $R$  — полное кольцо матриц над совершенным кольцом, то  $R$  — CC-кольцо.*

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** (1) Предположим, что  $S \neq E_P(S)$  для некоторого простого проективного модуля  $S$  из категории  $\sigma(P)$ . Тогда из полуартиновости модуля  $P$  следует существование локального модуля длины два  $M \in \sigma(P)$ , у которого  $\text{Soc}(M) = S$ . Из  $P$ -проективности модуля  $S$  вытекает, что  $S \not\cong M/S$ . Значит,  $\text{End}(M)$  — тело, что противоречит условию пункта.

(2) Предположим, что  $eR(1 - e) \neq 0$ . Тогда  $M = \text{tr}_{eR}(1 - e)R \neq 0$  и из условия пункта следует, что  $M \subset J(eR)$ . Пусть  $M_0$  — максимальный подмодуль модуля  $M$  и  $N$  — дополнение по пересечению к  $M/M_0$  в  $eR/M_0$ . Тогда  $L = (eR/M_0)/N$  — однородный модуль, у которого  $\text{Soc}(L) \cong M/M_0$  и  $\text{Soc}(L) \subset J(L)$ . Так как  $R$  — полуартиново справа кольцо, модуль  $L$  содержит локальный подмодуль  $L_0$  длины два. Поскольку  $\text{tr}_L(1 - e)R = \text{Soc}(L)$  и  $\text{tr}_{L/\text{Soc}(L)}(1 - e)R = 0$ , кольцо  $\text{End}(L_0)$  является телом, что противоречит условию пункта. Полученное противоречие показывает, что  $eR(1 - e) = 0$ . Аналогично устанавливается равенство  $(1 - e)Re = 0$ .

(3) Утверждение пункта непосредственно следует из леммы 1.3 и п. (1) исходной леммы.

(4) Пусть  $M$  — произвольный ненулевой и непростой правый  $R$ -модуль. Согласно [7, теорема 3.10] модуль  $M$  обладает некоторым максимальным подмодулем  $N$ . Так как согласно условию пункта  $\text{Hom}(M/N, M) \neq 0$ , то  $\text{End}(M)$  обладает ненулевым гомоморфизмом  $f$ , у которого  $\text{Ker}(f) = N \neq 0$ .

(5) Ясно, что  $R$  является полуартиновым мах-кольцом. Тогда утверждение пункта непосредственно следует из того факта, что над кольцом  $R$  все простые правые (левые) модули изоморфны.  $\square$

Правый  $R$ -модуль  $M$  называется *регулярным*, если каждый его циклический подмодуль является прямым слагаемым модуля  $M$ .

**Лемма 1.10.** *Для конечно порожденного квазипроективного модуля  $P$  следующие условия равносильны:*

- (1)  $P$  является регулярным модулем;
- (2)  $P$  самопорождающийся и  $\text{End}(P)$  — регулярное кольцо.

**Доказательство.** (1) $\Rightarrow$ (2) Так как модуль  $P$  регулярен, он, очевидно, порождает каждый свой подмодуль. Тогда из [6, 18.5] следует, что  $P$  самопорождающийся.

Пусть  $f \in \text{End}(P)$ . Тогда  $Jm(f)$  конечно порожден и, следовательно, выделяется в виде прямого слагаемого в  $P$ . Поскольку согласно [6, 18.3]  $P$  проективен в  $\sigma(P)$ , то  $Jm(f)$  также проективен в  $\sigma(P)$ . Тем самым  $\text{Ker}(f)$  — прямое слагаемое в  $P$ . Тогда из [11, теорема 1] следует, что  $f$  — регулярный элемент кольца  $\text{End}(P)$ .

(2) $\Rightarrow$ (1) Пусть  $P_0$  — конечно порожденный подмодуль модуля  $P$ . Так как  $P$  самопорождающийся, существует эпиморфизм  $f : P_1 \oplus \dots \oplus P_n \rightarrow P_0$ , где  $P_i = P$  для каждого  $1 \leq i \leq n$ . Рассмотрим гомоморфизм  $f : P_1 \oplus \dots \oplus P_n \rightarrow P_1 \oplus \dots \oplus P_n$ , действующий по правилу  $f((p_1, p_2, \dots, p_n)) = (f((p_1, p_2, \dots, p_n)), 0, \dots, 0)$ . Поскольку  $\text{End}(P_1 \oplus \dots \oplus P_n) \cong M_n(\text{End}(P))$ , то  $\text{End}(P_1 \oplus \dots \oplus P_n)$  является регулярным кольцом. Следовательно, согласно [11, теорема 1]  $Jm(f)$  — прямое слагаемое в  $P_1 \oplus \dots \oplus P_n$ . Тогда  $P_0$  является прямым слагаемым модуля  $P$ .  $\square$

## 2. Обобщенные $SV$ -кольца

**Теорема 2.1.** *Пусть  $P$  — квазипроективный конечно порожденный самопорождающийся правый  $R$ -модуль. Тогда следующие условия равносильны:*

(1)  $P$  — обобщенный  $SV$ -модуль и у  $\text{End}(P)$  каждый примитивный образ артинов;

(2) в категории  $\sigma(P/SI(P))$  каждый модуль является модулем со свойством подъема и для каждого ординала  $\alpha$  существует такое семейство взаимно ортогональных центральных идемпотентов  $\{\pi_i\}_{i \in I}$  из  $\text{End}(P/SI_\alpha(P))$ , что

$$SI_{\alpha+1}(P)/SI_\alpha(P) = \bigoplus_{i \in I} \pi_i(P/SI_\alpha(P)).$$

**Доказательство.** (1) $\Rightarrow$ (2) Из лемм 1.2 и 1.8 вытекает, что  $P/SI(P)$  — полудокальный модуль. Согласно [2, теорема 6] в категории  $\sigma(P/SI(P))$  каждый модуль является модулем со свойством подъема. Вторая часть утверждения пункта получается из следствия 1.7.

(2) $\Rightarrow$ (1) Тот факт, что  $P$  является обобщенным  $SV$ -модулем, доказывается стандартными рассуждениями. Так как согласно [6, 46.2] категория  $\sigma(P/SI(P))$  эквивалентна категории всех правых  $\text{End}(P/SI(P))$ -модулей, каждый правый  $\text{End}(P/SI(P))$ -модуль является модулем со свойством подъема и из [5, 13.68]

следует, что  $\text{End}(P/SI(P))$  является артиновым полуцепным кольцом, у которого  $J^2(\text{End}(P/SI(P))) = 0$ .

Пусть  $T$  — примитивный идеал кольца  $\text{End}(P)$ . Если  $\text{Hom}(P, SI(P)) \subset T$ , то  $\text{End}(P)/T$  — гомоморфный образ  $\text{End}(P)/\text{Hom}(P, SI(P)) \cong \text{End}(P/SI(P))$  и, следовательно,  $\text{End}(P)/T$  — артиново простое кольцо. Пусть  $\text{Hom}(P, SI(P)) \not\subset T$  и  $\alpha$  — наименьший ординал, для которого  $\text{Hom}(P, SI_\alpha(P)) \not\subset T$ . Ясно, что  $\alpha$  — непредельный ординал. Пусть  $\phi : \text{End}(P)/\text{Hom}(P, SI_{\alpha-1}(P)) \rightarrow \text{End}(P)/T$  — естественный гомоморфизм. Тогда  $\text{Hom}(P, SI_\alpha(P))/\text{Hom}(P, SI_{\alpha-1}(P)) \neq 0$ . Из предположения пункта вытекает, что  $\text{Hom}(P, SI_\alpha(P))/\text{Hom}(P, SI_{\alpha-1}(P))$  — прямая сумма полных колец матриц над телами. Следовательно, в кольце  $\text{End}(P)/\text{Hom}(P, SI_{\alpha-1}(P))$  существует такой центральный идемпотент  $e$ , что  $\phi(e) \neq 0$  и  $e \text{End}(P)/\text{Hom}(P, SI_{\alpha-1}(P))$  — простое артиново кольцо. Так как  $\text{End}(P)/T$  — неразложимое кольцо, имеем  $\phi(1 - e) = 0$  и, стало быть,

$$\text{End}(P)/T \cong e \text{End}(P)/\text{Hom}(P, SI_{\alpha-1}(P)). \quad \square$$

**Теорема 2.2.** Для кольца  $R$  следующие условия равносильны:

- (1)  $R$  — обобщенное справа  $SV$ -кольцо, у которого каждый примитивный образ артинов;
- (2)  $R/SI(R)$  — артиново полуцепное кольцо, у которого  $J^2(R/SI(R)) = 0$ , и  $SI_{\alpha+1}(R)/SI_\alpha(R)$  — прямая сумма полных колец матриц конечных порядков над телами для каждого ординала  $\alpha$ ;
- (3)  $R$  — обобщенное справа  $SV$ -кольцо и каждая прямая сумма попарно изоморфных простых инъективных правых  $R$ -модулей является инъективным модулем;
- (4)  $R$  — обобщенное справа  $SV$ -кольцо и каждый максимально неразложимый фактор  $R/I$  кольца  $R$  является артиновым полуцепным, у которого  $J^2(R/I) = 0$ ;
- (5)  $R$  — обобщенное  $SV$ -кольцо.

**Доказательство.** Эквивалентность пп. (1), (2) следует из теоремы 2.1.

(2)  $\Rightarrow$  (5) Очевидно.

(5)  $\Rightarrow$  (1) Пусть  $P$  — примитивный идеал кольца  $R$ . Допустим, что  $R/P$  не является классически полупростым кольцом. Тогда из [1, теорема 3.4; 2, теорема 12] вытекает, что  $R/P$  — примитивное полуартиново кольцо, у которого  $SI_1(R/P_{R/P}) \neq 0$  и  $SI_1(R/P_{R/P}) \neq 0$ . Поскольку полупростые модули  $\text{Soc}(R/P_{R/P})$  и  $\text{Soc}(R/P_{R/P})$  однородны, существует такой примитивный идемпотент  $e \in R/P$ , что  $eR/P$  и  $R/Pe$  являются соответственно правым и левым инъективными модулями. Тогда из леммы 1.3 следует, что  $R/P$  — классическое полупростое кольцо, что противоречит нашему предположению.

(2)  $\Rightarrow$  (3) Пусть  $\{S_i\}_{i \in I}$  — семейство попарно изоморфных простых инъективных правых  $R$ -модулей. Если  $E(\bigoplus_{i \in I} S_i)SI(R) \neq 0$ , то для некоторого непредельного ординала  $\alpha$  имеем  $E(\bigoplus_{i \in I} S_i)SI_{\alpha-1}(R) = 0$  и  $E(\bigoplus_{i \in I} S_i)SI_\alpha(R) \neq 0$ . Следовательно, модуль  $E(\bigoplus_{i \in I} S_i)$  можно рассматривать как  $R/SI_{\alpha-1}(R)$ -модуль, и в кольце  $R/SI_{\alpha-1}(R)$  найдется такой центральный идемпотент  $e$ , что  $eR/SI_{\alpha-1}(R)$  — полупростой модуль и  $E(\bigoplus_{i \in I} S_i)e \neq 0$ . Тогда  $S_i e \neq 0$  и  $S_i(1 - e) = 0$  для каждого  $i \in I$ . Легко видеть, что в этом случае  $E(\bigoplus_{i \in I} S_i)(1 - e) = 0$ . Таким образом, модуль  $E(\bigoplus_{i \in I} S_i)$  можем рассматривать как правый  $eR/SI_{\alpha-1}(R)$ -



модуль. Поскольку  $eR/SI_{\alpha-1}(R)$  — классически полупростое кольцо,  $E(\bigoplus_{i \in I} S_i) = \bigoplus_{i \in I} S_i$ . Если  $E(\bigoplus_{i \in I} S_i)SI(R) = 0$ , то модуль  $E(\bigoplus_{i \in I} S_i)$  можно рассматривать как правый  $R/SI(R)$ -модуль. Поскольку  $R/SI(R)$  — нётерово кольцо, из [4, 27.3] следует, что  $E(\bigoplus_{i \in I} S_i) = \bigoplus_{i \in I} S_i$ .

(3) $\Rightarrow$ (1) Пусть  $P$  — примитивный идеал кольца  $R$ . Тогда  $\text{Soc}(R/P_R)$  — однородный полупростой модуль. Предположим, что  $R/P$  не является классически полупростым кольцом. Из [1, теорема 3.4; 2, теорема 12] получаем, что  $R/P_R$  содержит простой инъективный подмодуль. Тогда в силу предположения пункта модуль  $\text{Soc}(R/P_R)$  инъективен. Поскольку  $\text{Soc}(R/P_R)$  существует в  $R/P_R$ , то  $\text{Soc}(R/P_R) = R/P_R$ , что противоречит нашему предположению. Следовательно,  $R/P$  является классически полупростым кольцом.

(2) $\Rightarrow$ (4) Пусть  $R/P$  — максимально неразложимый фактор кольца  $R$ . Если  $SI(R) \subset P$ , то  $R/P$  является артиновым полуцепным кольцом, у которого  $J^2(R/P) = 0$ . Допустим, что  $SI(R) \not\subset P$ . Тогда, рассуждая так же, как и при доказательстве импликации (2) $\Rightarrow$ (1) из доказательства теоремы 2.1, получаем, что  $R/P$  изоморфно полному кольцу матриц конечного размера над некоторым телом.

(4) $\Rightarrow$ (1) Пусть  $P$  — примитивный идеал кольца  $R$ . Поскольку  $R/P$  — неразложимое кольцо, импликация непосредственно следует из [12, следствие 1.7].  $\square$

### 3. SV- и CSL-кольца

**Теорема 3.1.** Для квазипроективного полуартинова регулярного модуля  $P$  следующие условия равносильны:

- (1)  $P$  — CSL-модуль;
- (2)  $P$  — mod-ретрактабельный модуль;
- (3)  $P$  — SV-модуль.

**Доказательство.** (1) $\Rightarrow$ (3) Так как фактор-модуль регулярного модуля по инвариантному подмодулю является регулярным модулем, импликация непосредственно следует из лемм 1.4 и 1.9.

(2) $\Rightarrow$ (3) Пусть  $S \in \sigma(P)$  — простой модуль. Предположим, что  $S \neq E_P(S)$ . Из доказательства п. (1) леммы 1.9 следует, что модуль  $E_P(S)$  содержит локальный подмодуль  $L$  длины два, у которого  $\text{Soc}(L) = S$ . Ясно, что существует эпиморфизм  $f : \bigoplus_{i \in I} P_i \rightarrow E_P(S)$ , где  $P_i = P$  для каждого  $i \in I$ . Для некото-

рых непрелельных ординалов  $\alpha$  и  $\beta$  выполняются условия  $f(\text{Soc}_{\alpha-1}(P)) = 0$ ,  $f(\text{Soc}_{\alpha}(P)) \neq 0$  и  $f(\text{Soc}_{\beta-1}(P)) \subset S$ ,  $f(\text{Soc}_{\beta}(P)) \not\subset S$ . Поскольку  $J(f(\text{Soc}_{\beta}(P))) \neq 0$ , имеем  $f(\text{Soc}_{\beta-1}(P)) \neq 0$ . Следовательно,  $\alpha < \beta$ . Так как  $P$  — квазипроективный регулярный модуль,  $\text{Hom}(P/\text{Soc}_{\beta-1}(P), \text{Soc}_{\alpha}(P)/\text{Soc}_{\alpha-1}(P)) = 0$ . Следовательно,  $L/S \not\cong S$  и  $\text{Hom}(L, S) = 0$ . Получили противоречие с предположением пункта.

Импликации (3) $\Rightarrow$ (1) и (3) $\Rightarrow$ (2) проверяются непосредственно.  $\square$

Эквивалентность пп. (1) и (3) в следующем утверждении установлена в [13, теорема 2.8].

**Следствие 3.2.** Для регулярного полуартинова кольца  $R$  следующие утверждения равносильны:

- (1)  $R$  — правое CSL-кольцо;
- (2)  $R$  — правое mod-ретрактабельное кольцо;

(3)  $R$  — правое  $SV$ -кольцо.

**Теорема 3.3.** Для полуартинова кольца  $R$  следующие условия равносильны:

- (1)  $R$  — mod-ретрактабельное кольцо;
- (2)  $R$  —  $CSL$ -кольцо;
- (3) каждый максимальный неразложимый фактор кольца  $R$  изоморфен полному кольцу матриц конечного порядка над совершенным кольцом.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (1) $\Rightarrow$ (2) Импликация проверяется непосредственно.

(2) $\Rightarrow$ (3) Достаточно показать, что всякое полуартиново  $CSL$ -кольцо  $R$  содержит такой ненулевой центральный идемпотент  $e$ , что  $eR$  — полное кольцо матриц конечного порядка над совершенным кольцом. Пусть  $R$  — полуартиново справа  $CSL$ -кольцо. Легко видеть, что каждый правый идеал кольца  $R$ , не содержащийся в  $J(R)$ , содержит в себе локальное прямое слагаемое модуля  $R_R$ . Тогда из леммы 1.1 и пп. (2), (3) леммы 1.9 непосредственно следует существование идемпотента  $e$  с указанным выше свойством.

(3) $\Rightarrow$ (1) Пусть  $M$  — правый  $R$ -модуль и  $S$  — простой подмодуль модуля  $M$ . Покажем, что  $\text{Hom}(M, S) \neq 0$ . Если  $N$  — дополнение по пересечению подмодуля  $S$  в  $M$ , то  $(S + N)/N$  — существенный подмодуль модуля  $M/N$ . Поэтому без ограничения общности можно считать, что  $S$  — существенный подмодуль модуля  $M$ . Из условия пункта и [5, 13.12(2)] вытекает, что  $R/\text{Ann}(M)$  — полное кольцо матриц конечного порядка над локальным кольцом. Тогда импликация непосредственно следует из того факта, что  $R/\text{Ann}(M)$  — полуартиново так-кольцо, над которым все правые (левые) простые модули изоморфны.  $\square$

Эквивалентность пп. (1) и (5) в следующем утверждении установлена в [14].

**Следствие 3.4.** Для кольца  $R$  следующие утверждения равносильны:

- (1)  $R$  — совершенное  $CSL$ -кольцо;
- (2)  $R$  — совершенное mod-ретрактабельное кольцо;
- (3)  $R$  — правое  $CC$ -кольцо;
- (4)  $R$  — левое  $CC$ -кольцо;
- (5)  $R$  — конечное прямое произведение полных колец матриц конечных порядков над совершенными кольцами.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Ввиду левой и правой симметричности условия п. (5) достаточно показать эквивалентность пп. (1)–(3) и (5). Эквивалентность (1)  $\Leftrightarrow$  (2)  $\Leftrightarrow$  (5) непосредственно следует из предыдущей теоремы, эквивалентность (3)  $\Leftrightarrow$  (5) — из [9, теорема 3.10] и пп. (2), (4), (5) леммы 1.9.  $\square$

**Теорема 3.5.** Для регулярного кольца, у которого каждый примитивный образ артинов, следующие условия эквивалентны:

- (1)  $R$  — правое mod-ретрактабельное кольцо;
- (2)  $R$  —  $SV$ -кольцо.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (1) $\Rightarrow$ (2) Из [15, теорема 6.6; 10, теоремы 2, 8] следует, что без ограничения общности можем считать кольцо  $R$  строго регулярным. Пусть  $xR$  — произвольный правый циклический  $R$ -модуль. Если  $E(xR)\text{Ann}(x) \neq 0$ , то для некоторого ненулевого центрального идемпотента  $e \in R$  имеем  $E(xR)e \cap xR \neq 0$  и  $xRe = 0$ . С другой стороны,  $E(xR)e \cap xR = xRe = 0$ . Полученное противоречие показывает, что  $E(xR)$  можно рассматривать как инъективный  $R/\text{Ann}(x)$ -модуль. Так как кольцо  $R/\text{Ann}(x)$  mod-ретрактабельно, существует ненулевой  $R/\text{Ann}(x)$ -гомоморфизм  $f : E(xR) \rightarrow xR$ . Поскольку

кольцо  $R/\text{Ann}(x)$  регулярно,  $xR = N \oplus M$ ,  $N \subset f(E(xR))$ , где  $M, N$  — подмодули модуля  $xR$  и  $N \neq 0$ . Пусть  $\pi$  — проекция на первое слагаемое относительно разложения  $xR = N \oplus M$ . Так как  $N$ , очевидно, является проективным  $R/\text{Ann}(x)$ -модулем, эпиморфизм  $\pi f$  расщепляющий. Таким образом, правый  $R$ -модуль  $xR$  содержит ненулевой инъективный подмодуль. Из проведенных рассуждений следует, что над кольцом  $R$  каждый правый модуль содержит ненулевой инъективный подмодуль. Тогда из теоремы 2.2 и [16] следует, что  $R$  —  $SV$ -кольцо.

(2) $\Rightarrow$ (1) Очевидно.  $\square$

**Теорема 3.6.** Пусть  $R$  — кольцо, у которого каждый правый идеал является идеалом. Следующие утверждения равносильны:

- (1)  $R$  — mod-ретрактабельное кольцо;
- (2)  $R$  — полуартиново кольцо.

**Доказательство.** (1) $\Rightarrow$ (2) Если  $S$  — простой правый  $R$ -модуль и  $N$  — ненулевой подмодуль модуля  $E(S)$ , то  $\text{Hom}(N, S) \neq 0$ . Следовательно, модуль  $N$  обладает максимальным подмодулем и из [17, теорема 1] вытекает, что  $R$  — max-кольцо. Тогда из теоремы 3.5 [18, лемма 3.2; 5, 5.51, 5.54] следует, что  $R$  — полуартиново кольцо.

(2) $\Rightarrow$ (1) Пусть  $S$  — простой подмодуль правого  $R$ -модуля  $M$ . Без ограничения общности можно считать, что  $S$  — существенный подмодуль модуля  $M$ . Пусть  $M_0$  — максимальный подмодуль модуля  $M$  и  $x \in M \setminus M_0$ . Ясно, что можем рассматривать  $xR$  как правый  $R/\text{Ann}(x)$ -модуль. Положим  $\bar{R} = R/\text{Ann}(x)$ . Так как  $\bar{R}_{\bar{R}} \cong x\bar{R}$  — полуартинов однородный модуль,  $\bar{R}$  — локальное кольцо. Следовательно,  $\bar{R}/J(\bar{R})_{\bar{R}} \cong S_{\bar{R}}$ . Таким образом,  $S_R \cong xR/J(xR) = xR/(xR \cap M_0) \cong M/M_0$ .  $\square$

**Следствие 3.7.** Для коммутативного кольца  $R$  следующие условия равносильны:

- (1)  $R$  — mod-ретрактабельное кольцо;
- (2)  $R$  — полуартиново кольцо.

**Теорема 3.8.** Пусть  $P$  — квазипроективный конечно порожденный модуль. Если  $P$  является  $SV$ -модулем, то  $P$  регулярен и  $\text{End}(P)$  — правое  $SV$ -кольцо.

**Доказательство.** Из [6, 23.8] следует, что  $P$  является порождающим объектом категории  $\sigma(P)$ . Значит, согласно [6, 46.2] категория  $\sigma(P)$  эквивалентна категории правых  $\text{End}(P)$ -модулей. Тогда каждый ненулевой правый  $\text{End}(P)$ -модуль содержит ненулевой инъективный подмодуль и из [16, теорема 13] следует, что  $\text{End}(P)$  — правое  $SV$ -кольцо. Так как согласно [19, предложение 2.3]  $\text{End}(P)$  является регулярным кольцом, из леммы 1.10 получаем, что модуль  $P$  регулярен.  $\square$

**Следствие 3.9** [19, теорема 2.9]. Пусть  $R$  — правое  $SV$ -кольцо и  $P$  — конечно порожденный проективный правый  $R$ -модуль. Тогда  $\text{End}(P)$  является правым  $SV$ -кольцом.

**Доказательство.** Утверждение непосредственно следует из теоремы 3.8 и того факта, что над правым  $SV$ -кольцом каждый правый модуль является  $SV$ -модулем.  $\square$

**Теорема 3.10.** Для конечно порожденного квазипроективного правого  $R$ -модуля  $P$  следующие условия равносильны:

- (1)  $P$  —  $SV$ -модуль;
- (2)  $P$  — регулярный обобщенный  $SV$ -модуль;
- (3)  $P$  —  $V$ -модуль, который является обобщенным  $SV$ -модулем.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (1) $\Rightarrow$ (2) Импликация следует из теоремы 3.8.

(2) $\Rightarrow$ (3) Из леммы 1.10 получаем, что  $P$  является самопорождающимся модулем и  $\text{End}(P)$  — регулярное кольцо. Так как согласно [6, 46.2] категория  $\sigma(P)$  эквивалентна категории правых  $\text{End}(P)$ -модулей,  $\text{End}(P)$  — регулярное обобщенное  $SV$ -кольцо. Тогда согласно [1, теорема 3.7]  $\text{End}(P)$  является правым  $V$ -кольцом. Следовательно,  $P$  —  $V$ -модуль.

(3) $\Rightarrow$ (1) Импликация следует из [2, теорема 3.5].  $\square$

Из результатов разд. 3 непосредственно вытекает

**Теорема 3.11.** Для кольца  $R$  следующие утверждения равносильны:

- (1)  $R$  —  $SV$ -кольцо;
- (2)  $R = SI(R)$  и  $SI_{\alpha+1}(R)/SI_{\alpha}(R)$  является прямой суммой полных колец матриц конечных порядков над телами для каждого ординала  $\alpha$ ;
- (3)  $R$  — правое  $SV$ -кольцо, у которого каждый примитивный образ является артиновым кольцом;
- (4)  $R$  — правое  $V$ -кольцо, над которым каждый правый и левый модули слабо регулярны;
- (5)  $R$  — регулярное кольцо, над которым каждый правый и левый модули слабо регулярны;
- (6)  $R$  — регулярное мод-ретрактабельное кольцо, у которого каждый примитивный образ артинов;
- (7)  $R$  — регулярное полуартиново  $CSL$ -кольцо.

ЗАМЕЧАНИЕ. Пусть  $K$  — некоторое поле и  $R = \prod_{i=1}^{\infty} K_i$ , где  $K_i = K$  для каждого натурального числа  $i$ . Тогда из [20, теорема 18] и теоремы 3.5 следует, что  $R$  —  $CSL$ -кольцо, которое не является мод-ретрактабельным кольцом. В силу изложенных выше результатов имеют место следующие строгие включения:

$$\{CS\text{-кольца}\} \subset \{\text{мод-ретрактабельные кольца}\} \subset \{CSL\text{-кольца}\}.$$

**Открытые вопросы.** 1. Описать регулярные правые  $CSL$ -кольца.

2. Является ли регулярное правое мод-ретрактабельное кольцо правым  $SV$ -кольцом?

3. Является ли правое мод-ретрактабельное кольцо полуартиновым справа кольцом?

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Абызов А. Н. Слабо регулярные кольца над нормальными кольцами // Сиб. мат. журн. 2008. Т. 49, № 4. С. 721–738.
2. Абызов А. Н. Обобщенные  $SV$ -модули // Сиб. мат. журн. 2009. Т. 50, № 3. С. 481–488.
3. Абызов А. Н., Туганбаев А. А. Кольца, над которыми все модули являются  $I_0$ -модулями. II // Фунд. и прикл. математика. 2007. Т. 14, № 2. С. 193–200.
4. Туганбаев А. А. Кольца, над которыми все модули являются  $I_0$ -модулями // Фунд. и прикл. математика. 2008. Т. 14, № 5. С. 3–12.
5. Туганбаев А. А. Теория колец, Арифметические модули и кольца. М.: МЦНМО, 2009.
6. Wisbauer R. Foundations of module and ring theory. Philadelphia: Gordon and Breach, 1991.

7. Camillo V. P., Fuller K. R. A note on Loewy rings and chain conditions on primitive ideals // Module theory. Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verl., 1979. P. 75–86. (Lect. Notes Math.; V. 700).
8. Jans J. P. Projective-injective modules // Pac. J. Math. 1959. V. 9. P. 1103–1108.
9. Amini B., Ershad M., Sharif H. Coretractable modules // J. Aust. Math. Soc. 2009. V. 86, N 3. P. 289–304.
10. Ecevit S., Kosan M. T. On rings all of whose modules are retractable // Arch. Math. 2009. V. 45, N 1. P. 71–74.
11. Shanny R. F. Regular endomorphism rings of free modules // J. London Math. Soc. 1971. V. 2, N 4. P. 553–354.
12. Burgess W. D., Stephenson W. An analogue of the Pierce sheaf for noncommutative rings // Commun. Algebra. 1978. V. 6, N 9. P. 863–886.
13. Dombrovskaya M., Marks G. Asymmetry in the converse of Schur's lemma // Commun. Algebra. 2010. V. 38, N 3. P. 1147–1156.
14. Alaoui M., Haily A. Perfect rings for which the converse of Schur's lemma holds // Publ. Mat., Barc. 2001. V. 45, N 1. P. 219–222.
15. Goodearl K. R. Von Neumann regular rings. 2nd ed. Malabar, FL: Krieger, 1991.
16. Dung N. V., Smith P. F. On semiartinian  $V$ -modules // J. Pure Appl. Algebra. 1992. V. 82, N 1. P. 27–37.
17. Faith C. Rings whose modules have maximal submodules // Publ. Mat., Barc. 1995. V. 39, N 1. P. 201–214.
18. Yu H. P. On quasiduo rings // Glasgow Math. J. 1995. V. 37. P. 21–31.
19. Baccella G. Semi-artinian  $V$ -rings and semi-artinian Von Neumann regular rings // J. Algebra. 1995. V. 173, N 3. P. 587–612.
20. Hirano Y., Park J. J. Rings for which the converse of Schur's lemma holds // Math. J. Okayama Univ. 1991. V. 33, N 1. P. 121–131.

*Статья поступила 25 февраля 2011 г., окончательный вариант — 21 ноября 2011 г.*

Абызов Адель Наилевич  
НИИММ им. Н. Г. Чеботарева, отдел алгебры и математической логики,  
ул. Профессора Нужи́на, 17, Казань 420008  
aabyzov@ksu.ru