

**НЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ  
РАЦИОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**  
А. С. Трепалин<sup>1</sup> (Москва, ИППИ РАН, ЛАГ ВШЭ)  
trepalin@mcsme.ru

**Определение 1.** Поверхность  $X$ , определённая над полем  $\mathbb{k}$ , называется  $\mathbb{k}$ -рациональной, если  $X$  бирационально эквивалентна  $\mathbb{P}_{\mathbb{k}}^2$ .

Для определения является ли поверхность  $\mathbb{k}$ -рациональной или нет, важна следующая теорема:

**Теорема 1** ([Isk96, Глава 4]). *Минимальная рациональная поверхность  $X$ , определённая над совершенным полем  $\mathbb{k}$ , является  $\mathbb{k}$ -рациональной тогда и только тогда, когда выполнены следующие два условия:*

- (i)  $X(\mathbb{k}) \neq \emptyset$ ;
- (ii)  $K_X^2 \geq 5$ .

Мы обобщим предыдущую теорему на случай факторов поверхностей.

**Теорема 2.** *Если  $X$  — поверхность дель Пеццо степени  $d$ ,  $X(\mathbb{k})$  — всюду плотно,  $G \subset \text{Aut}(X)$ , то  $X/G$  —  $\mathbb{k}$ -рациональна для всех случаев, кроме следующих:*

- (1)  $d = 4$ ,  $G \cong \{1\}, C_2, C_4, C_2^2$ ;
- (2)  $d = 3$ ,  $G \cong \{1\}, C_3$ ;
- (3)  $d = 2$ ,  $G \cong \{1\}, C_2, C_3, C_2^2, C_4, S_3, D_4, Q_8$ ;
- (4)  $d = 1$ ,  $G \cong \{1\}, C_2, C_3, C_6$ , где  $C_n$  — циклическая группа порядка  $n$ ,  $D_n$  — диэдральная группа порядка  $2n$ ,  $S_n$  — симметрическая группа,  $Q_8$  — группа кватернионов.

Доказанный результат может быть существенно использован для исследования группы Кремоны плоскости  $\text{Cr}(2, \mathbb{k}) = \text{Bir}(\mathbb{P}_{\mathbb{k}}^2)$ .

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [Isk96] V. A. Iskovskikh, Factorization of birational mappings of rational surfaces from the point of view of Mori theory, Uspekhi Mat. Nauk, 1996, 51, 3–72, (in Russian); translation in Russian Math. Surveys, 1996, 51, 585–652

---

<sup>1</sup>Работа выполнена при поддержке Лаборатории алгебраической геометрии НИУ ВШЭ